

Méně PMS, více pohody.

Díky Agnucaston®



PROVEN BY SCIENCE.
RECOMMENDED BY WOMEN.






**PŘÍRODNÍ NEHORMONÁLNÍ LÉČBA
PREMENSTUAČNÍHO SYNDROMU. ŠETRNÁ A SPOLEHLIVÁ.**



Vždy si pečlivě prostudujte příbalový list, účinky a použití léku konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Agnucaston potahované tablety je volně prodejný léčivý přípravek obsahující Agni casti fructus extractum siccum. Pro ženy starší 18 let - jedna tableta denně vcelku 3x denně s dostatečným množstvím tekutiny.

Přírodní nehormonální léčba premenstruačního syndromu.
Agnucaston® zmírňuje nepříjemné příznaky PMS - šetrně a spolehlivě.




Lék z přírody

Léčí fyzické i psychické příznaky premenstruačního syndromu snížením hladiny prolaktinu.



Bez hormonů


Přírodní složení bez syntetických hormonů.



1 tableta denně

Pohodlné užívání - stačí pouze jedna tableta denně.

Proč si vybrat Agnucaston®?



Síla přírody

Obsahuje standardizovaný extrakt z plodů drmků obecného, který zmírňuje nepříjemné příznaky premenstruačního syndromu.




Bez syntetických hormonů

Agnucaston® je rostlinný lék, který neobsahuje žádné syntetické hormony. Představuje přirozenou volbu pro ženy, které hledají řešení příznaků PMS bez hormonální léčby.



Úleva od nepříjemných příznaků

Zmírňuje fyzické i psychické projevy PMS, jako jsou podrážděnost, výkyvy nálad, změny v chuti k jídlu, únava či bolest hlavy.



Účinky ověřené klinickými studiemi

Agnucaston® spojuje sílu přírody s vědeckými poznatky. Je na trhu už více než 30 let a jeho účinky jsou podloženy klinickými daty.

Dávkování a způsob užití



Jak užívat Agnucaston®?

1 tableta 1 × denně

Tablety užívejte nerozkousané, zapijte dostatečným množstvím vody.

Aby bylo dosaženo optimálního léčebného efektu, doporučuje se užívat nejméně po dobu 3 měsíců (i během menstruace).

Agnucaston® je určen pro dospělé ženy od 18 let.

Vaše hodnocení



„Lék užívám zatím pár týdnů a překvapilo mě, že už teď cítím změnu. Problémy s a před menstruací se poslední roky stupňovaly a přidaly se i nevladatelné výkyvy nálad vždy v druhé polovině cyklu. Tentokrát se toto téměř neobjevilo a začátek menstruace se posunul blíž k normální délce.“

— Martina, 36 let

Složení

Jedna potahovaná tableta obsahuje 4 mg suchého extraktu z plodů Agnus castus (vitexu jahňacího) (7-11 : 1), extrahovaného ethanolem 70 % (V/V). Pomocná látka se známým účinkem je monohydrát laktózy 25,0 mg. Další pomocné látky jsou povidon 30, koloidní bezvodý oxid křemičitý, bramborový škrob, monohydrát laktózy, mikrokrytalická celulóza, magnesium-stearát, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), hlinitý lak indigokarmínu (E132), makrogol 6000, granulat methakrylového kopolymeru typu RL.

Máte otázky? My máme odpovědi.

Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi, které vám pomohou lépe porozumět účinkům, použití a bezpečnosti léku Agnucaston®.

K čemu se Agnucaston® používá?

Agnucaston® je rostlinný lék na zmírnění příznaků premenstruačního syndromu (PMS), jako jsou podrážděnost, změny nálad, změny v chuti k jídlu, únava či bolest hlavy.

Před započetím léčby se u pocitu bolesti, tlaku nebo napětí v prsou vždy poraďte s lékařem, jelikož důvodem mohou být onemocnění, která vyžadují další lékařské vyšetření.

Jak se Agnucaston® užívá?

Doporučená dávka je 1 potahovaná tableta jednou denně. Tablety se nežvýkají a je třeba je zapít dostatečným množstvím vody. Pro dosažení optimálního účinku se doporučuje užívat nejméně 3 měsíce bez přerušování, i během menstruace.

Kdy pocítím zlepšení?

Účinek se obvykle projeví po několika týdnech pravidelného užívání. Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.

Od jakého věku je Agnucaston® vhodný?

Přípravek je určen pro dospělé ženy od 18 let.

Obsahuje Agnucaston® laktózu?

Ano, přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem.

Je vhodný během těhotenství nebo kojení?

Užívání přípravku se nedoporučuje během těhotenství ani v období kojení.

Co dělat, když se příznaky nezlepší?

Pokud se stav nezlepší po 3 měsících užívání nebo se zhorší, vyhledejte lékaře.

Agnucaston® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci pro uživatele.