

dimalen

1 mg/ml

perorální kapky, roztok



Úleva od projevů alergie a svědění

Obsahuje
antihistaminikum
dimetinden-maleinát

Pro dospělé, dospívající
a děti od 1 roku
(alergická rýma od 6 let)

Nástup účinku
do 30 minut

Jeden ml obsahuje 1 mg dimetinden-maleinátu (1 ml = 20 kapek).

Kopřivka

Atopický ekzém

Sezónní senná rýma

Bodnutí hmyzem

Plané neštovice

Dávkování

Pediatrická populace

- Doporučená denní dávka pro děti od 1 do 11 let
- 2 kapky/kg tělesné hmotnosti/den rozdělené do 3 dávek

Dospělí a dospívající od 12 let

- 20 až 40 kapek třikrát denně
- U pacientů se sklonem ke spavosti je doporučená dávka 40 kapek na noc a 20 kapek ráno

Zkrácená informace o přípravku

Název a složení přípravku: Dimalen 1 mg/ml perorální kapky, roztok. Jeden ml obsahuje 1 mg dimetinden-maleinátu (1 ml = 20 kapek).

Indikace: Symptomatická léčba alergií onemocnění: Kůže: Kopřivka, pruritus různé etiologie, atopický ekzém s předchozí lékařskou diagnózou. Respirační systém: sezónní (senná rýma) a celoroční rýma s předchozí lékařskou diagnózou. Úleva od svědění spojeného s infekčními chorobami (např. plané neštovice) s předchozí lékařskou diagnózou, nebo po kousnutí nebo bodnutí hmyzem. Přípravek Dimalen je indikován u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. Přípravek Dimalen je indikován u alergické rýmy u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. **Dávkování a způsob podání:** Dospělí a dospívající od 12 let: Doporučená denní dávka je 3 až 6 mg dimetinden-maleinátu rozdělených do 3 dávek, tj. 20 až 40 kapek třikrát denně. U pacientů se sklonem ke spavosti je doporučená dávka 40 kapek na noc a 20 kapek ráno. **Pediatrická populace:** Doporučená denní dávka pro děti od 1 do 11 let je 0,1 mg dimetinden-maleinátu/kg tělesné hmotnosti, tj. 2 kapky/kg tělesné hmotnosti/den rozdělené do 3 dávek. Dávkovací tabulka viz SPC. Bez konzultace s lékařem se přípravek Dimalen nemá používat déle než 14 dnů. Kapky se užívají neředěné. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Kojenci a děti do 1 roku. **Speciální upozornění:** Stejně jako u ostatních antihistaminik se doporučuje zvýšená opatrnost v případě podávání pacientům s glaukomem nebo obstrukcí hrdla močového měchýře (např. hypertrofie prostaty). Podobně jako u všech 3 antagonistů H1-receptorů a některých H2-antihistaminik je nutná zvýšená pozornost u pacientů s epilepsií. Dimetinden je třeba používat u starších pacientů s opatrností. Nepoužívejte u starších pacientů s příznaky zmatenosti. U malých dětí bylo pozorováno navození excitability podáním antihistaminik. **Klinicky významné interakce:** Při současném užívání dvou nebo více léčivých přípravků, které tlumí CNS, lze očekávat zesílení tlumivého účinku na CNS. To může mít nežádoucí a život ohrožující následky. Tricyklická antidepresiva a anticholinergika (např. bronchodilatancia, spasmolytika působící na hladkou svalovinu gastrointestinálního traktu, mydriatika, antimuskarinová parasymptolytika používaná v urologii) mohou mít při podání spolu s antihistaminiky aditivní antimuskarinový účinek, což může zvýšit riziko zhoršení glaukomu nebo retence moči. Prokarbazin a antihistaminika mají být současně podávány s opatrností kvůli možnému zesilujícímu účinku a minimalizaci účinku CNS. **Těhotenství, kojení a fertilita:** Nejsou k dispozici údaje o používání dimetinden-maleinátu během těhotenství. Dimetinden-maleinát se nemá používat u těhotných žen, pokud benefit z léčby pro matku nepřevyšuje riziko pro plod, a má být užíván pouze pod lékařským dohledem. Užívání přípravku Dimalen v období kojení se nedoporučuje. Nejsou k dispozici údaje týkající se vlivu na fertilitu u člověka. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Dimetinden může snižovat úroveň mentální pozornosti u některých pacientů. V takovém případě se pacienti mají vyvarovat řízení motorových vozidel, obsluhy strojů a dalších činností vyžadujících zvýšenou pozornost. To platí zejména v kombinaci s alkoholem. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté: únava; Časté: somnolence, nervozita. Úplný seznam viz SPC. **Doba použitelnosti:** 2 roky. Po prvním otevření: 6 měsíců. **Uchovávání:** Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabíčce, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Velikost balení:** Jantarově hnědá skleněná lahvička třídy III s bílým PP šroubovacím uzávěrem, opatřená bezbarvým LDPE dětským bezpečnostním uzávěrem a bezbarvým LDPE kapátkem. Velikost balení: 20, 50, 3×20 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. **Datum první registrace:** 22. 7. 2021 **Držitel rozhodnutí o registraci:** Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká Republika. **Registrační číslo:** 24/075/20-C

Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznámte s úplnou informací o přípravku (SPC).

ATC kód:
R06AB03

PDK kód:
5492088

Cena výrobce:
179,00 Kč

Doporučená cena:
269,00 Kč